Metz AGRAR Center GmbH

FarmXpert DÜNGE-STRATEGIE

N-ERGY Start

Biostimulat zum Start in die Vegetation

Als idealer Biostimulant für gestresstes Getreide sorgt N-ERGY Start für ein verbessertes vegetatives Wachstum und Bestockung. Der einzigartige Komplex aus Aktivstoffen wirkt sofort zielgerichtet auf das Pflanzenwachstum und sorgt für eine hohe Stresstoleranz.

Vorteile:

> Hauptkulturen – Verbesserung des vegetativen Wachstums und der Bestockung, für eine kräftige Entwicklung
> Gemüsekulturen: besseres Wurzelvolumen, besseres Wachstum, besserer Vegetationsstart
> Kartoffelpflanze: Erhöhung der Knollenanzahl pro Pflanze
> Kartoffel: Erhöhung von Kaliber und Ertrag
> Rübe: Begünstigte Etablierung und verbesserter Ertrag

N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO
55	400				

B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
					96

Angaben in g/L für Flüssigprodukte

Komplex aus Energiebausteinen und Pflanzenhormonen

Dosierung und Anwendung:

finden Sie auf Blatt 2

Metz Agrar Center GmbH - 91723 Dittenheim
Tel 09834 / 555 - Fax 09834 / 1319 - www.metz-agrarcenter.de

N-ERGY Start

Biostimulat zum Start in die Vegetation

Seite 2

Dosierung und Anwendung:

Getreide: Dosis/ha 3 - 5 L – Mindest-Anzahl Anwendungen: 1 – Mindest-Wasseraufwandmenge: 120 - 150 L/ha – Anwendungsstadium: 3-Blatt-Stadium bis Beginn Schossen (BBCH 13 - 30)

Mais: Dosis/ha 3 - 5 L – Mindest-Anzahl Anwendungen: 1 – Mindest-Wasseraufwandmenge: 120 - 150 L/ha - Anwendungsstadium: 4-6-Blatt-Stadium (BBCH 14 - 16)

Raps: Dosis/ha 3 - 5 L – Mindest-Anzahl Anwendungen: 1 – Mindest-Wasseraufwandmenge: 120 - 150 L/ha – Anwendungsstadium: 3-Blatt-Stadium bis Beginn Längenwachstum (BBCH 13 - 30)

Flachs: Dosis/ha 3 L – Mindest-Anzahl Anwendungen: 1 – Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 L/ha – Anwendungstadium: 4-7-Blatt-Stadium (BBCH 14-17)

Kartoffelpflanze: Dosis/ha 10 L – Mindest-Anzahl Anwendungen: 1-2, im Abstand von 10 Tagen zwischen zwei Behandlungen – Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 L/ha – Anwendungsstadium: zu Beginn Knollenanlage (BBCH 40)

Kartoffel: Dosis/ha 5 L – Mindest-Anzahl Anwendungen: 2-3, im Abstand von 10 Tagen zwischen zwei Behandlungen – Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 L/ha – Anwendungsstadium: ab 50 % der max. art-/sortenspezifischen Knollenmasse erreicht (BBCH 45)

Rübe: Dosis/ha 5 L – Anzahl Anwendungen: 1-2, im Abstand von 10 Tagen zwischen zwei Behandlungen – Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 L/ha – Anwendungsstadium: 4-6 Blatt-Stadium (BBCH 14 – 16)

Gemüse: Dosis/ha 3 L – Mindest-Anzahl Anwendungen: 1-2, im Abstand von 10 Tagen zwischen zwei Behandlungen – Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 L/ha – Anwendungsstadium: 10 Tage nach Auspflanzung bzw. zum 4-6-Blatt-Stadium