# 200 NSMg

## Blattdünger mit Sofortwirkung – auch für rote Gebiete

**Der gebrauchsfertige, äußerst schonende Stickstoff-Blattdünger sorgt bei ungünstiger Witterung (Kälte, Trockenheit) oder sonstiger Stressphase für eine optimale Stickstoffversorgung. Die enthaltenen Mineralstoffe erfüllen die spezifischen Bedürfnisse der Anbaukulturen für optimale Erträge.**

**Vorteile:**
> gebrauchsfertiges flüssiges Produkt mit äußerst schonender Wirkung für das Blatt
> Die Synergie zwischen Stickstoff und Schwefel verbessert die Wirksamkeit der Spritzbehandlung
> natürliche "komplexbildende" Eigenschaften = Fähigkeit stabile und lösliche Komplexe mit Metallionen (Fe-Cu-Mn-Zn) zu bilden
> natürliche Adjuvanswirkung (Auftragen)
> Haftung (Regenfestigkeit)
> Befeuchtung (verhindert Kristallisieren)
> Absorptionsrage nahe 80-90%

| N | $P_2O_5$ | $K_2O$ | MgO | $SO_3$ | CaO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | 50 | 100 | |

| B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
|---|---|---|---|---|---|

LS Lignosulfonate

Angaben in g/L für Flüssigprodukte

**Dosierung und Anwendung:**
finden Sie auf Blatt 2

Metz Agrar Center GmbH - 91723 Dittenheim
Tel 09834 / 555 - Fax 09834 / 1319 - www.metz-agrarcenter.de

# 200 NSMg

## Blattdünger mit Sofortwirkung – auch für rote Gebiete



**Dosierung und Anwendung:**

Getreide: Dosis/ha 40 L - Max. Konzentration: 40 L in mind. 80 L Wasser - Stadium: ab dem Austritt des letzten Blattes (mögliche Verwendung bis zu 60 L)

Mais: Dosis /ha 40 L - Max. Konzentration: 40 L in mind. 160-200 L Wasser - Stadium: 1 Anwendung ab Stadium 6-8 Blätter

Obstbäume: Max. Konzentration: 40 L in mind. 100 L Wasser
10 L/ha: 1 Anwendung, Stadium 50% Blattfall für den Blattabbau
20-30 L/ha: 1 Anwendung, Stadium Nachernte, vor Blattfall für die Bevorratung

Raps: Dosis/ha 20-40 L - Max. Konzentration: 40 L in mind. 160-200 L Wasser- Stadium: 1-2 Anwendungen ab Stadium Beginn Längenwachstum bis Stadium Ende Austritt der Blütenknospe

Sonnenblume: Dosis/ha 30 L - Max. Konzentration: 40 L in mind. 160-200 L Wasser - Stadium: 1-2 Anwendungen ab Stadium 5-6 Blätter bis Stadium Austritt der Blütenknospe

Kartoffel: Dosis/ha 20-25 L - Max. Konzentration: 20 L in mind. 100-200 L Wasser - Stadium: 1 Anwendung im Stadium Knollenbildung, um die frühzeitige Abreife der Blätter zu verhindern.

Andere Kulturen: Dosis/ha 10-15 L - Max. Konzentration: 20 L in 100-200 L Wasser - Stadium: auf ausreichend entwickelter Vegetation

Metz Agrar Center GmbH - 91723 Dittenheim
Tel 09834 / 555 - Fax 09834 / 1319 - www.metz-agrarcenter.de